

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

- Skrevet af Bonni Rathje-Ottenberg

Løvsangeren er en spurvefugl tilhørende familien af sangere. Sammen med gransangeren udgør løvsangeren en af de almindeligste danske sangere – blot er deres sange meget forskellige fra hinanden. Løvsangerens sang er let at identificere med dens hurtige, klare fløjtetoner i starten, som så ebber ud i lyse toner. Den er vidt udbredt herhjemme i en lang række forskellige landskabstyper. Der kendes tilfælde af hybridisering mellem løvsanger og gransanger.



Løvsanger. Foto: Bjarne Nielsen

Løvsangeren forekommer i Nord- og Vesteuropa og østover i et snævert bælte helt op til Beringstrædet. Bestanden er klassificeret som livskraftig på den globale rødliste, på trods af at løvsangeren har været i markant tilbagegang i Danmark siden 1980'erne – der i dag godt 25% af bestanden fra dengang. Den danske bestand ligger på omkring 600.000 par.

Den er en langdistancetrækker og bestanden fra Danmark overvintrer i tropisk Vestafrika, hvor de skandinaviske løvsangere overvintrer i tropisk Østafrika. Både i Norge, Sverige og Finland er sangeren den talrigeste ynglefugl – bestanden ligger her tilsammen et sted mellem 20 og 40 millioner par.

Løvsangeren ankommer typisk fra først i april til midt i maj, hvor et stort træk passerer gennem Danmark, mest i maj. Den yngler i alle skovtyper (gerne lyse), i moser med birketræer og pilekrat, og sekundært i parker og i større og ældre haver. Den lægger typisk 5-8 æg fra midt i maj i en overdækket rede på jorden af tørt græs, som har et indgangshul i siden og er beskyttet af tæt vegetation. Æggene

udruges af hunnen på 11-15 dage og ungerne forlader reden efter 12-15 dage. Der lægges tit 2 kuld per år.

Løvsangeren forveksles gerne med gransangeren, bjergløvsangeren eller bogfinke.

<https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/13120>

<https://www.naturbasen.dk/art/597/loevsanger>