

## Kvækerfinke

Kvækerfinken er en flot, lille fugl med interessante adfærdsmønstre, og så er det en typisk vintergæst i Danmark.

### Kendetegn og udseende

Kvækerfinken ligner bogfinken, men kan kendes på dens sorte ryg og den orange brystfarve.

Hunnen er mere afdæmpet i farverne, mens hannen har en markant, sort hætte og stærkere orange farver i yngletiden.



Foto: Johan Chr. Homann

### Levesteder, udbredelse, føde og adfærd

Kvækerfinken yngler i de nordlige skove i Skandinavien, Rusland og Sibirien, og om vinteren trækker mange af dem mod syd og kan findes i Danmark fra oktober til marts. Vi kan ofte finde dem i parker, haver og skovområder. De spiser primært frø, især fra bøgetræer, hvorfor man ofte ser kvækerfinker på jorden fremfor i træerne. Ser man dem i en have, vil de også samle føde på jorden. I ynglesæsonen spiser de også gerne insekter. Kvækerfinker er meget sociale, og de trækker og søger som regel føde med andre individer og gerne i nærheden af bogfinker. Det er ikke ualmindeligt at se invasioner af kvækerfinker

– det er et spektakulært syn. Iflg Lars Jonsson (i bogen VINTERFUGLE) blev en flok kvækerfinker, der fløj til overnatning, anslået til 70 mio. Fugle.



Foto: Johan Chr. Homann

### Trækfuglens rejse

På nedenstående link kan man se nogle af kvækerfinkernes vinter- og sommerkvarter.

[https://eurobirdportal.org/den/da/new\\_home/#home/FRIMON/q52weeks](https://eurobirdportal.org/den/da/new_home/#home/FRIMON/q52weeks)

Det er en interessant serie af øjebliksbilleder, der viser, hvor fuglene befandt sig i hvilke måneder i 2024. ”Filmen” kan sættes på pause, hvis man vil se nærmere på en specifik periode.

Forleden, da jeg gik en tur i en bøgeskov (Roden Skov ved Gråsten) og så en flok små fugle i skovbunden, var min første indskydelse kvækerfinke. Med kikkerten for øjnene så jeg med det samme 20-30 kvækerfinker – i samme kikkertbillede – i gang med at fouragere. De sad tæt i skovbunden og flyttede sig i samme retning nærmest rytmisk men uafhængigt af de andre kvækerfinker. Samlet set så det ud som om en lille sky af finker ”rullede” gennem skoven.

Min største oplevelse med kvækerfinker som art var, da vi i januar og februar 2020 havde fornøjelsen af en invasion i Årtoft Plantage ved Aabenraa. De fleste observationer i DOF-basen fra den periode har mellem 200.000 og 500.000 individer. Det var en fantastisk

oplevelse, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at vi også kan have sort sol i det østlige Sønderjylland.

Jeg følger med i klimapolitikken, og jeg synes, det er et både interessant og spændende emne, og ofte relaterer jeg de uhåndgribelige emner til noget mere konkret, fx fuglene og emner, hvor jeg kan finde specifikke data og tendenser. Vi ser efterhånden flere fuglearter, der egentlig kun burde være syd for Danmark, og der er flere arter, der nu også yngler i Danmark, fx sølvhejrer.

Mon klimapolitikken, eller andre årsager, gør, at vi om få år vil se markant færre kvækerfinker? Det håber jeg ikke.

#### FAKTABOKS

- Latin: *Fringilla montifringilla*
- Længde: 14-16 cm
- Vægt: 23-29 g
- Yngler almindeligt i nåleskovsbæltet i Nordeuropa
- Meget almindelig – både som trækgæst og vintergæst
- Ynglealder: 1 år
- Højeste alder af ringmærket fugl: min. 7 år 11 mdr.
- 1 kuld på 5-7 æg, rugetid: 14 dage. Ungetid: 14 dage
- Ynglefugle i Sverige: Anslået til 2 mio. par (ingen ynglende i DK)

Ole Tønder

December 2024